A CSOMAGBAN LÉVŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE

ÁLLJ MEG, MIELŐTT FELBONTOD

NE HASZNÁLD, HA RÁD IGAZ

- ✕ 18 évnél fiatalabb vagy. Gyermeken nem alkalmazható.
- ✕ Hajlamos vagy keloidra vagy kóros hegképződésre, akkor is, ha az a tested más részén volt.
- ✕ Véralvadási zavarod van (például hemofília), vagy vérhígítót szedsz. A gyógyszert emiatt ne hagyd abba.
- ✕ Nem kontrollált cukorbetegséged van.
- ✕ Aktív daganatos betegséged van, kemoterápiát vagy sugárkezelést kapsz.
- ✕ HIV/AIDS, hepatitis vagy más súlyos, az egész szervezetet érintő fertőzésed van.
- ✕ Isotretinoint (Roaccutane) szedsz, vagy az elmúlt 6 hónapban szedtél.
- ✕ Allergiás vagy az alkoholos fertőtlenítőre.

NE HASZNÁLD OTT, AHOL A BŐRÖN VAN

- ✕ nyílt seb, horzsolás, égés, friss heg, műtét vagy hajbeültetés után be nem gyógyult bőr, friss tetoválás vagy sminktetoválás;
- ✕ ARC rosacea (rózsahimlő: tartós vagy visszatérő arcpír, látható hajszálerek, pattanásszerű gyulladás), bármelyik formája, akkor is, ha most nyugodt;
- ✕ ARC aktív, gyulladt pattanás vagy súlyos akne (az egész érintett arcfélen ne);
- ✕ herpesz, szemölcs, gombás, bakteriális vagy vírusos fertőzés;
- ✕ ekcéma, pikkelysömör, kiütés, bármilyen aktív bőrgyulladás vagy irritáció;
- ✕ anyajegy, bőrkinövés, napfény okozta érdes folt, bőrdaganat vagy bármilyen bőrelváltozás, főleg ha orvos még nem nézte meg.

MOST VÁRJ VELE, HA

- ✕ a bőröd leégett vagy frissen lebarnult;
- ✕ a következő 2 hétben sokat leszel napon (nyaralás, strand), vagy szoláriumba mennél;
- ✕ lázas vagy, vagy épp fertőző betegséged van;
- ✕ a bőröd irritált, húzódik vagy hámlik valamilyen kozmetikumtól.

ELŐBB KÉRDEZZ ORVOST, HA

- ? terhes vagy, vagy szoptatsz. Csak a kezelőorvosod jóváhagyásával;
- ? visszatérő herpeszed van a kezelni kívánt területen;
- ? legyengült az immunrendszered, vagy immunrendszert gyengítő gyógyszert, szteroidot szedsz;
- ? autoimmun vagy kötőszöveti betegséged van (például lupus, szkleroderma, vitiligo);
- ? ekcémád vagy pikkelysömöröd van, akkor is, ha a kezelni kívánt terület most tünetmentes;
- ? cukorbeteg vagy, vagy lassan gyógyulnak a sebeid;
- ? rendszeresen szedsz aszpirint vagy más gyulladáscsökkentőt. Ne hagyd abba magadtól;
- ? fém-, főleg nikkelallergiád van. A mikrotű orvosi rozsdamentes acél (SUS304), aranybevonattal;
- ? ARC a bőröd sebek vagy pattanások után könnyen foltosodik, vagy sötétebb a bőrtípusod;
- ? bőrgyógyászati kezelés alatt állsz, vagy a területen nemrég lézer, hámlasztás, töltőanyag vagy botox volt;
- ? FEJBŐR a hajhullásod hirtelen jött, foltos, vagy heges hajhullást állapítottak meg.

SOHA

- ✕ Szemhéjon, a szem körüli vékony bőrön, nyálkahártyán, szájon, orrnyílásban, nemi szerveken.
- ✕ Másodszor. Egy Dermastamp egy kezelés, utána kidobod. Ne tisztítsd, ne fertőtlenítsd újra.
- ✕ Más emberrel megosztva, akkor sem, ha családtag. Más emberen se használd.
- ✕ Ha a csomagolás sérült vagy felnyitottnak tűnik.
- ✕ Ha bármelyik mikrotű görbe, hajlott, sérült vagy rozsdás.
- ✕ Erős nyomással vagy húzva. Nem lesz hatékonyabb, sérülést okozhat.
- ✕ Érzéstelenítő krémmel, szérummal, olajjal, C-vitaminnal vagy más hatóanyaggal együtt. A kezelés előtt és aznap semmit ne kenj a kezelt bőrre.
- ✕ Fertőtlenítés nélkül.

Igaz rád valamelyik pont, vagy bizonytalan vagy? Ne bontsd fel. Írj az info@dermastamp.hu címre: 30 napon belül visszatérítem az árát. Ha valamiről nem szól ez a lap, és bizonytalan vagy, ne kísérletezz: írj nekem.

A dobozban lévő használati útmutató bővített változata.

FORDÍTS

HA EGYIK PONT SEM IGAZ RÁD: ÍGY HASZNÁLD

1. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

1. A kezelés előtti héten ne égj le, és ne napozz.
2. Moss kezet szappannal és meleg vízzel, töröld szárazra.
3. Mosd le a kezelendő bőrt kímélő, habzó lemosóval, öblítsd le, töröld szárazra. Smink és krém ne legyen rajta.
4. A csomagot közvetlenül használat előtt nyisd fel.
5. A mikrotűkhöz ne érj kézzel, és ne tedd le a stampet szennyezett felületre.
6. Öblítsd le a tűfejet meleg vízzel.
7. Fertőtlenítsd a tűfejet legalább 70%-os alkohollal, 60–120 másodpercig (áztasd a kupakban).
8. Várd meg, amíg teljesen megszárad.

2. KEZELÉS

1. Első alkalommal kisebb területen, finoman kezdd.
2. Oszd a területet kisebb részekre.
3. Tedd a stampet merőlegesen a bőrre, nyomd le finoman, majd emeld fel. Ne húzd a bőrön.
4. Egy részen 4–6-szor, mindig kicsit odébb.
5. ARC A csontos részeken (homlok, orr körül) különösen finoman.
6. Apró, pontszerű vérzés előfordulhat. A vérzés nem cél.
7. Erős fájdalomnál, jelentősebb vérzésnél vagy szokatlan panasznál azonnal hagyd abba.

3. UTÁNA: MIT HAGYJ KI, ÉS MEDDIG

- ✕ **Aznap:** semmit ne kenj rá. Ne mosd le, ne dörzsöld, ne vakard, hagyd megszáradni. Ne eddz.
- ✕ **24 óráig:** smink, uszoda, szauna, szolárium, erős nap.
- ✕ ARC **48 óráig:** fedő alapozó, alkoholos arcvíz, benzoil-peroxid.
- ✕ **72 óráig:** retinol és más retinoid, C-vitamin szérum.
- ✕ **1 hétig:** savas hámlasztók (AHA, BHA), bőrradír.
- ✕ **2 hétig:** napozás és szolárium.
- ✕ FEJBŐR A minoxidilt és más fejbőrre való készítményt a kezelés napján hagyd ki, másnap folytasd.
- ✕ **Ugyanarra a területre** legkorábban 7–14 nap múlva stampelj újra, új Dermastamppel. Arcon én 2–3 hetet várok.

4. MÁSNAPTÓL

- ✓ Reggel kímélő, habzó lemosó, majd egyszerű hidratáló.
- ✓ **Fényvédelem minden nap:** árnyék, sapka vagy kalap, a testen ruha.
- ✓ ARC A szabadon maradó kezelt bőrre, az arcra SPF 50 fényvédő. A sapka az arcon nem helyettesíti.
- ✓ Kerüld a déli, erős napot. A frissen kezelt bőrön a nap könnyebben hagy tartós foltot.
- ✓ Ha egy terméktől ég vagy erősen kipirul a bőröd, hagyd ki még pár napig.

5. AMI VÁRHATÓ, ÉS MAGÁTÓL ELMÚLIK

- ✓ bőrpír, melegség, enyhe duzzanat;
- ✓ pontszerű vérzés a kezelés közben;
- ✓ érzékenység, enyhe fájdalom, viszketés, bizsergés;
- ✓ szárazság, hámlás a következő napokban.

Ezek általában néhány órán vagy napon belül megszűnnek.

6. HA EZT LÁTOD, FORDULJ ORVOSHOZ

Ezek már nem a megszokott, magától elmúló reakciók az 5. pontból. Ha bármelyiket észleled, ne várj vele, és ne stampelj tovább.

- ! erős fájdalmat, égő érzést, duzzanatot érzel, vagy a vérzés nem áll el;
- ! a következő napokban a fájdalom fokozódik, gennyet vagy lázat észlelsz, vagy a pír terjed;
- ! hólyagok, herpesz vagy csomók jelennek meg a kezelt területen, akár hetekkel később;
- ! a bőröd tartósan sötétebb vagy világosabb foltos lesz;
- ! bármilyen tünet erősödik, vagy egy hét után sem múlik el.

Arc- vagy torokduzzanat, nehézlégzés esetén azonnal hívd a 112-t.

7. A HASZNÁLT STAMP

- ✓ Tedd vissza a védőcsomagolásba, és zárt háztartási hulladékba dobd. Ne a szelektívbe.
- ✓ Használt eszköz éles, vérrel érintkezett: gyermekektől és háziállatoktól elzárva kezeld.
- ✓ A bontatlan stampet száraz, hűvös, naptól védett helyen tárold.

Ha bármilyen nem várt reakciót tapasztalsz, írd meg nekem is: info@dermastamp.hu. Minden bejelentést feljegyzek, és továbbítom a gyártónak.

FORDÍTS